



Odporúčania týkajúce sa liečby liekom



Príručka pre predpisujúceho lekára

VPDM, CRVO, DME, BRVO, mCNV

Prosím, poskytnite svojim pacientom, liečeným Eyleou,
Príručku pre pacientov vrátane audio CD
(čítanie z Príručky pre pacienta)
a Písomnú informáciu pre používateľa.

Ďalšie informácie a podrobnosti o lieku Eylea nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)

Ďalšie informácie a podrobnosti o lieku Eylea nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)

Obsah

KLÚČOVÉ SUMÁRNE INFORMÁCIE	4
Indikácie.....	4
Kontraindikácie	4
Dávkovanie	4
Špeciálne upozornenia na uchovávanie a spôsob podávania.....	4
Po podaní injekcie.....	5
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	6
Terapeutické indikácie.....	6
Informácie o lieku	6
Odporúčania pre dávkovanie	7
Kontraindikácie	7
OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ	8
NÁVOD NA POUŽITIE A ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM	9
POSTUP PODANIA INJEKCIE.....	11
PO PODANÍ INJEKCIE.....	13
NEŽIADUCE ÚČINKY	13
DOHLAD NAD NEŽIADUCIMI ÚČINKAMI.....	13

KLÚČOVÉ SUMÁRNE INFORMÁCIE

Indikácie

- neovaskulárna (vlhká) vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
- poškodenia zraku spôsobené makulárnym edémom v dôsledku oklúzie sietnicovej žily (oklúzia vetvy sietnicovej žily (BRVO, Branch Retinal Vein Occlusion) alebo oklúzia centrálnej sietnicovej žily (CRVO, Central Retinal Vein Occlusion)
- poškodenia zraku spôsobené diabetickým makulárnym edémom (DME)
- poškodenia zraku spôsobené choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (myopická CNV)

Kontraindikácie

- Precitlivosť na liečivo aflibercept alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. SPC
- Aktívna alebo suspektná očná alebo periokulárna infekcia
- Aktívny závažný vnútroočný zápal

Dávkovanie

Odporúčaná dávka Eyley je 2 mg afliberceptu, čo zodpovedá 50 mikrolitrom.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie a spôsob podávania

- **Uchovávať v chladničke** (2 °C až 8 °C).
- **Pred použitím** sa môže neotvorené blistrové balenie Eyley uchovávať **pri izbovej teplote** (menej ako 25 °C) počas 24 hodín.
- Vo všeobecnosti sa musí zabezpečiť adekvátne **anestézia a asepse**, vrátane podania širokospektrálneho lokálneho mikrobicídneho prípravku (napr. jódovaný povidon sa nanáša na kožu okolo oka, očné viečko a povrch oka).
- Odporúča sa **chirurgická dezinfekcia rúk, použitie sterilných rukavíc, sterilného rúška a sterilného spekula očného viečka** (alebo náhrady).
- **Navodenie mydriázy pred injekčným zákrokom nie je nevyhnutné.**
- Naplnená injekčná striekačka ako aj injekčná liekovka sú určené na jedno použitie len v jednom oku. **EYLEA nie je určená na podávanie vo viacerých dávkach**, ďalšie miešanie alebo rozdeľovanie dávky. Použitie viac ako jednej injekcie z naplnenej injekčnej striekačky alebo liekovky **môže viesť ku kontaminácii a následnej infekcii**.
- Podanie intravitreálnych injekcií, vrátane injekcií Eyley, sa spájajú s **endoftalmitídou, vnútroočným zápalom, rhegmatogénnym odlúčením sietnice, trhlinou v sietnici a iatrogénnou traumatickou kataraktou**.
- V priebehu 60 minút po podaní intravitreálnej injekcie, vrátane injekcií Eyley, sa pozorovali **zvýšenia vnútroočného tlaku**.
- EYLEA je terapeutický proteín, preto **je možná imunogenita** s EYLEOU
- Po intravitreálnom použití inhibitorov VEGF sa hlásili systémové nežiaduce udalosti, vrátane mimoočného krvácania a arteriálnych tromboembolických príhod, a existuje teoretické riziko, že môžu súvisieť s inhibíciou VEGF.

- **Ženy vo fertilnom veku** musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a najmenej 3 mesiace po poslednej intravitreálnej injekcii EYLEY.
- Eylea sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby nepreváži potenciálne riziko pre plod.
- **Eylea sa neodporúča počas dojčenia. Po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Eyleou.**

Po podaní injekcie

- **Vyhodnotiť videnie bezprostredne po injekcii** (pohyb ruky alebo počítanie prstov)
- **Okamžite po intravitreálnom podaní injekcie by mali byť pacienti monitorovaní kvôli zvýšeniu vnútroočného tlaku.** Primeraný monitoring má pozostávať z kontroly perfúzie terča zrakového nervu alebo tonometrie. Ak je to potrebné, majú byť k dispozícii sterilné nástroje na paracentézu.
- **Po intravitreálnom podaní injekcie majú byť pacienti poučení, aby bez meškania hlásili akékoľvek symptómy nasvedčujúce endoftalmitide** (napr. bolesť oka, sčervenanie oka, fotofóbia, rozmazané videnie).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pred začatím liečby Eyleou musí každý pacient dostať **Informačnú príručku pre pacienta vrátane zvukového záznamu (CD) a Pisomnej informácie pre používateľa**. Za poskytnutie týchto materiálov pacientovi je zodpovedný lekár. Zároveň je potrebné pacientovi vysvetliť dôsledky anti-VEGF liečby. Veľmi dôležité je s pacientom prediskutovať hlavne všetky možné príznaky a symptómy závažných nežiaducich účinkov, predovšetkým kedy vyhľadať lekársku pomoc.

Terapeutické indikácie

Liek Eylea je indikovaný u dospelých na liečbu:

- neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)
- poškodenia zraku spôsobeného makulárnym edémom v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily (BRVO, Branch Retinal Vein Occlusion) alebo oklúzie centrálnej sietnicovej žily (CRVO, Central Retinal Vein Occlusion)
- poškodenia zraku spôsobeného diabetickým makulárnym edémom (DME)
- poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Informácie o lieku

- Eylea 40 mg/ml injekčný roztok.
- Liek Eylea je určený len na intravitreálne injekčné podanie.
Eyleu musí podávať iba kvalifikovaný lekár so skúsenosťami s podávaním intravitreálnych injekcií.
- Injekčný roztok je číry, bezfarebný až bledožltý a izo-osmotický.
- Injekčný roztok treba pred podaním vizuálne skontrolovať, či nie sú prítomné mechanické nečistoty, zmeny sfarbenia alebo fyzikálneho vzhľadu. Ak spozorujete takéto zmeny, liek náležite zlikvidujte.
- Naplnená injekčná striekačka ako aj injekčná liekovka sú určené na jedno použitie len v jednom oku.
- Eylea nie je registrovaná na súčasné podanie viacerých dávok, na miešanie s inými liekmi alebo na rozdelenie dávky. Podanie viac ako jednej injekcie z naplnenej injekčnej striekačky alebo liekovky môže viesť ku kontaminácii a následnej infekcii.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

- Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 90 mikrolitrov, čo zodpovedá 3,6 mg afliberceptu. To poskytuje použiteľné množstvo na podanie jednorazovej dávky 50 mikrolitrov obsahujúcej 2 mg afliberceptu. Naplnená injekčná striekačka obsahuje množstvo prevyšujúce odporúčanú dávku 2 mg. Extrahovateľný objem injekčnej striekačky (90 mikrolitrov) sa nesmie použiť celý.
Pred podaním konkrétnej dávky je nutné vytlačiť zo striekačky nadbytočné množstvo roztoku.
- Jedna injekčná liekovka obsahuje 100 mikrolitrov, čo zodpovedá 4 mg afliberceptu. To poskytuje použiteľné množstvo na podanie jednorazovej dávky 50 mikrolitrov obsahujúcej 2 mg afliberceptu. Injekčná liekovka obsahuje množstvo prevyšujúce odporúčanú dávku 2 mg. Extrahovateľný objem injekčnej liekovky (100 mikrolitrov) sa nesmie použiť celý. Po natiahnutí extrahovateľného objemu z liekovky do striekačky, je z nej potrebné vytlačiť pred podaním konkrétnej dávky nadbytočné množstvo roztoku.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

- Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C až 8 °C).
- Nezmrazujte.
- Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte v blistri a vo vonkajšom obale z dôvodu ochrany pred svetlom.
- Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale z dôvodu ochrany pred svetlom.
- Pred použitím sa môže neotvorená injekčná liekovka alebo blister s liekom Eylea uchovávať pri izbovej teplote (menej ako 25 °C) do 24 hodín. Sterilný blister s naplnenou striekačkou neotvárajte mimo čistej aplikačnej miestnosti. Po otvorení blistra alebo injekčnej liekovky dodržiavajte aseptické podmienky.

Odporúčania pre dávkovanie

- Odporúčaná dávka lieku Eylea je 2 mg afliberceptu, čo zodpovedá 50 mikrolitrom.
- Všimnite si, že odporúčané dávkovanie pre vlhkú formu VPDM, RVO, DME a mCNV sa navzájom líšia. Úplné informácie o odporúčaníach pre dávkovanie sú uvedené v SPC.

Kontraindikácie

- Precitlivosť na aflibercept alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 v SPC.
- Aktívna alebo suspektná očná alebo periokulárna infekcia.
- Aktívny závažný vnútroočný zápal.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

Reakcie spojené s podaním intravitreálnych injekcií

Podanie intravitreálnych injekcií, vrátane injekcií EYLEY, sa spájajú s endoftalmitídou, vnútroočným zápalom, rhegmatogénnym odlúčením sietnice, trhlinou v sietnici a iatrogénnou traumatickou kataraktou (pozri časť 4.8 v SPC). Pri podávaní EYLEY sa musia vždy používať primerané aseptické injekčné postupy. Okrem toho počas týždňa po podaní injekcie má byť pacient sledovaný, čo umožní včasnú liečbu prípadnej infekcie. Pacienti majú byť poučení, aby bez meškania hlásili akékoľvek prejavy nasvedčujúce endoftalmitíde alebo ktorejkoľvek príhode uvedenej vyššie.

Zvýšenie vnútroočného tlaku

Monitorujte pacientov kvôli zvýšeniu vnútroočného tlaku v priebehu 60 minút po podaní intravitreálnej injekcie, vrátane injekcií Eyley, pretože sa pozorovali zvýšenia vnútroočného tlaku (pozri časť 4.8 v SPC). Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov s nedostatočne kontrolovaným glaukómom (nepodávajte Eyleu pokým je vnútroočný tlak ≥ 30 mmHg). Vo všetkých prípadoch sa preto musí monitorovať a primerane manažovať vnútroočný tlak aj perfúzia terča zrkovitého nervu.

Imunogenita

Eylea je terapeutický proteín, preto je možná imunogenita s Eyleou (pozri časť 4.8 v SPC).

Pacienti majú byť poučení, aby hlásili akékoľvek znaky alebo symptómy nasvedčujúce vnútroočnému zápalu, napríklad bolesť, fotofóbiu alebo začervenanie, ktoré môžu byť klinickým príznakom hypersenzitivity.

Systémové účinky

Po intravitreálnom použití inhibítorov VEGF sa hlásili systémové nežiaduce udalosti, vrátane mimoočného krvácania a arteriálnych tromboembolických príhod, a existuje teoretické riziko, že môžu súvisieť s inhibíciou VEGF. U pacientov, ktorí v priebehu posledných 6 mesiacov prekonalí cievnu mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak alebo infarkt myokardu, sú k dispozícii iba obmedzené údaje o bezpečnosti liečby CRVO, BRVO, DME alebo mCNV. Pri liečbe takýchto pacientov sa má postupovať s opatrnosťou.

Iné

Tak ako pri iných intravitreálnych liečbach VPDM, CRVO, BRVO, DME a mCNV pomocou anti-VEGF, aj tu platí nasledovné:

Ženy vo fertilnom veku

- Ženy vo fertilnom veku musia **používať účinnú antikoncepciu počas liečby a najmenej 3 mesiace po poslednej intravitreálnej injekcii Eyley**.

Gravidita

- Aj keď je systémová expozícia po podaní do oka veľmi nízka, Eylea sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby nepreváži potenciálne riziko pre plod.

Dojčenie

- Eylea sa neodporúča počas dojčenia. Po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Eyleou.

NÁVOD NA POUŽITIE A ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM

Príprava na podanie injekcie


- Podanie intravitreálnych injekcií musí vykonať v súlade s lekárskymi štandardmi a platnými postupmi kvalifikovaný lekár so skúsenosťami s podávaním intravitreálnych injekcií.
- Vo všeobecnosti sa musí zabezpečiť adekvátne anestézia a asepse vrátane lokálneho podania širokospektrálneho antiseptika (napr. jódovaný povidón aplikovaný na kožu okolo oka, očné viečko a povrch oka).
- Navodenie mydriázy pred injekčným podaním nie je nevyhnutné.
- Naplnená injekčná striekačka ako aj injekčná liekovka sú určené použitie len v jednom oku. EYLEA nie je určená na podávanie vo viacerých dávkach, ďalšie miešanie alebo rozdeľovanie dávky. Použitie viac ako jednej injekcie z naplnenej injekčnej striekačky alebo liekovky môže viesť ku kontaminácii a následnej infekcii.
- Odporúča sa chirurgická dezinfekcia rúk, použitie sterilných rukavíc, sterilného rúška a sterilného spekula očného viečka (alebo ekvivalentnej náhrady).
- Na intravitreálne podanie injekcie sa má použiť injekčná ihla 30 G x 1/2 palca.

Injekčná liekovka

1. Odstráňte plastové viečko a vydezinfikujte vonkajšiu časť gumenej zátky injekčnej liekovky.




2. Nasadíte 18 G injekčnú ihlu s 5-mikrónovým filtrom dodanú v škatuľke na 1-ml sterilnú injekčnú striekačku s nastavcom so závitom („Luer lock“).



3. Vtlačte injekčnú ihlu s filtrom do stredu zátky injekčnej liekovky až kým sa ihla nedotkne dna alebo spodného okraja liekovky.


4. Použitím aseptického postupu naberte celý obsah injekčnej liekovky s liekom Eylea do injekčnej striekačky. Držte injekčnú liekovku vo zvislej polohe, mierne naklonenú, aby sa uľahčilo úplné odobratie obsahu. Uistite sa, že je úkos ihly ponorený do roztoku, aby sa zabránilo nasatiu vzduchu. Pokračujte v nafahovaní lieku s naklonenou liekovkou a ponoreným úkosom filtračnej ihly do tekutiny.



5. Dbajte na to, aby ste pri vyprázdňovaní injekčnej liekovky dostatočne vytiahli piest, aby sa injekčná ihla s filtrom úplne vyprázdnila.

6. Odstráňte injekčnú ihlu s filtrom a zlikvidujte ju správnym spôsobom. Poznámka: Injekčná ihla s filtrom sa nesmie použiť na intravitreálne podanie injekcie.



7. Použitím aseptického postupu pootočením pevne nasadíte injekčnú ihlu 30 G x 1/2 palca na nastavtec so závitom („Luer lock“) na injekčnú striekačku.



8. Injekčnú striekačku s ihlou držte smerom nahor a skontrolujte v nej prítomnosť bubliniek. V prípade prítomnosti bubliniek injekčnú striekačku jemne poklepte prstom, kým bublinky nevystúpia na povrch.



9. Na odstránenie všetkých bubliniek a nadbytočného lieku pomaly zatlačte piest, aby ste zarovnali hrot piestu s ryskou, ktorá označuje na injekčnej striekačke 0,05ml. Aby sa predišlo predávkovaniu, nadbytočný objem musí byť odstránený pred podaním injekcie s liekom Eylea.



10. Injekčná liekovka je len na jednorazové použitie. Rozdeľovanie viacerých dávok z jednej naplnenej striekačky môže zvýšiť riziko kontaminácie a následnej infekcie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Ďalšie informácie a podrobnosti o lieku Eylea nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)


Naplnená injekčná striekačka

1. Keď ste pripravený na podanie lieku Eylea, otvorte škatuľku a vyberte sterilné blistrové balenie. Opatrne otvorte blistrové balenie tak, aby ste zabezpečili sterilitu jeho obsahu. Injekčnú striekačku položte na sterilnú podložku, kým sa pripravíte na kompletizáciu

2. Použitím aseptického postupu vyberte injekčnú striekačku zo sterilného blistrového balenia.


3. Pri odstraňovaní uzáveru injekčnej striekačky držte injekčnú striekačku v jednej ruke, zatiaľ čo palcom a ukazovákom druhej ruky uchopíte uzáver injekčnej striekačky.

Upozornenie: Uzáver injekčnej striekačky odkrúťte (uzáver neodlamujte).



4. Nevyfahajte piest, aby sa zamedzilo strate sterility lieku.


5. Použitím aseptického postupu pootočením pevne nasadte injekčnú ihlu na nadstavec so závitom („Luer lock“) na injekčnú striekačku



6. Injekčnú striekačku s ihlou držte smerom nahor, skontrolujte v nej prítomnosť bubliniek. V prípade prítomnosti bubliniek injekčnú striekačku jemne poklepte prstom, kým bublinky nevystúpia na povrch.



7. Na odstránenie všetkých bubliniek a nadbytočného lieku pomaly zatlačte na piest, aby ste zarovnali cylindrickú spodnú časť kuželovitého okraja piestu s čiernou ryskou dávky na injekčnej striekačke (čo zodpovedá 50 mikrolitrom).



8. Naplnená injekčná striekačka je len na jednorazové použitie. Rozdeľovanie viacerých dávok z jednej naplnenej striekačky môže zvýšiť riziko kontaminácie a následnej infekcie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

POSTUP PODANIA INJEKCIE


Postup podania antibiotík vykonajte v súlade s miestnymi lekáorskymi štandardmi a platnými postupmi.




1. Podajte lokálne anestetikum.




2. Nakvapajte dezinfekčný prostriedok (napríklad 5 % roztok jódovaného povidónu alebo jeho ekvivalent) na očné viečka, okraje očného viečka a do spojkovkeho vaku. Mydriáza pred injekčným podaním nie je nevyhnutná.



3. Aplikujte dezinfekčný roztok (napríklad 10 % roztok jódovaného povidónu alebo jeho ekvivalent) na pokožku okolo oka, očných viečok a mihalnice, pričom sa vyhnite nadmernému tlaku na oči.



4. Zakryte okolie oka sterilným rúškom a nasadte sterilné spekulum očného viečka.



5. Povedzte pacientovi, aby sa pozeral smerom od miesta podania injekcie. Zabezpečte správnu polohu oka. V mieste 3,5 až 4,0 mm za limbom označte miesto podania injekcie.



6. Injekčnú ihlu zaveďte do sklovca, vyhnite sa horizontálnemu meridiánu a smerujte do stredu očnej gule. Potom pomaly aplikujte objem injekcie 0,05 ml, pri opakovaných injekciách sa má použiť iné miesto vpichu na sklére.

Ďalšie informácie o postupe podania intravitreálnej injekcie nájdete tu

- Guidelines for Intravitreal Injections Procedure 2009. The Royal College of Ophthalmologists. K dispozícii na adrese: https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2015/01/2009-SCI-012_Guidelines_for_Intravitreal_Injections_Procedure_1.pdf. Sprístupnené 14. júla 2016.
- Age-Related Macular Degeneration: Guidelines for Management, September 2013. K dispozícii na adrese: <https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2013-SCI-318-RCOphth-AMD-Guidelines-Sept-2013-FINAL-2.pdf>. Sprístupnené 14. júla 2016.
- Jaissle GB et al. Recommendation for the implementation of intravitreal injections--statement of the German Retina Society, the German Society of Ophthalmology (DOG) and the German Professional Association of Ophthalmologists (BVA). Klin Monbl Augenheilkd. 2005 May;222(5):390-5. Article in German
- Société Française d'Ophtalmologie. Guidelines for intravitreal injections. Korobelnik JF et al. Recommendations - Guidelines for intravitreal injections. Journal français d'ophtalmologie (2009) 32, e1–e2.
- Video postupu podania intravitreálnej injekcie



PO PODANÍ INJEKCIE

- Vyhodnotiť videnie bezprostredne po injekcii (pohyb ruky alebo počítanie prstov).
- Okamžite po intravitreálnom podaní injekcie by mali byť pacienti monitorovaní kvôli zvýšeniu vnútroočného tlaku. Primeraný monitoring môže pozostávať z kontroly perfúzie terča zrakového nervu alebo tonometrie. Pre prípad potreby majú byť k dispozícii sterilné nástroje na paracentézu.
- Po podaní intravitreálnej injekcie majú byť pacienti poučení, aby bezodkladne hlásili akékoľvek symptómy, ktoré poukazujú na endoftalmitídu (napr. bolesť oka, začervenanie oka, fotofóbia, rozmazané videnie).
- Po podaní intravitreálnych injekcií podajte antibiotické kvapky v súlade s miestnymi alebo medzinárodnými lekáskymi štandardmi a platnými postupmi.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Pre úplný zoznam nežiaducich účinkov pozrite časť 4.8. Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC)

- **Endoftalmitída**

Pacienti môžu mať neprijemné pocity v oku alebo bolesť oka, zhoršenie začervenania oka, fotofóbiu alebo precitlivosť na svetlo, opuch a zmeny videnia, ako napríklad náhle zhoršenie videnia alebo rozmazané videnie.

- **Prechodne zvýšený vnútroočný tlak**

Pacienti môžu vidieť žiaru okolo svetiel, môžu mať začervenané oko, nevoľnosť, vracanie a zmeny zraku.

- **Katarakta (traumatická, nukleárna, subkapsulárna, kortikálna) alebo lentikulárne opacity**

Pacienti môžu vidieť menej jasné línie a tvary, môžu pozorovať tieň a menej jasné farby než predtým a môžu mať zmeny videnia.

- **Trhlina alebo odlúpenie pigmentového epitelu sietnice**

Pacienti môžu vidieť náhle záblesky svetla alebo sa u nich môžu náhle objaviť zákaly sklovca alebo sa môže zvýšiť ich počet. Môžu sa vyskytnúť výpadky časti zorného poľa a zmeny videnia.

DOHĽAD NAD NEŽIADUCIMI ÚČINKAMI

Ak sa u vášho pacienta vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, musí okamžite navštíviť oftalmológa.

Zodpovedajúci manažment VŠETKÝCH nežiaducich účinkov, vrátane tých, ktoré sa spájajú s intravitreálnou injekciou, sa má uskutočňovať v súlade s klinickou praxou a/alebo podľa štandardizovaných postupov.

Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskada/>.



Elektronickú verziu tohto edukačného materiálu nájdete na
<https://www.edumaterial.bayer.sk/>
alebo na www.bayer.sk





Bayer, spol. s r.o.
Twin City A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
tel. +421 2 592 13 111
www.bayer.sk

Ďalšie informácie a podrobnosti o lieku Eylea nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC).

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)